正　誤　表

「眼科薬剤クイックリファランス（改訂第２版 第１刷～第６刷)」
下記の箇所に誤りがございました。謹んでお詫びし訂正いたします。

頁	該当箇所	誤	正
10	表の最下段	モキシフロキサシン（MFLX） moxifloxacin **ベガモックス**（アルコン） ・4.キノロン骨格８位のメトキシ基に加え，７位にピロロピリジン基を新規に導入，主要な眼感染症の起炎菌に対し，強い抗菌力を示す．角膜，房水などへの組織移行が良好で，高濃度を維持する	フルオロキノロン系 モキシフロキサシン（MFLX） moxifloxacin **ベガモックス**（アルコン） ・4.キノロン骨格８位のメトキシ基に加え，７位にピロロピリジン基を新規に導入，主要な眼感染症の起炎菌に対し，強い抗菌力を示す．角膜，房水などへの組織移行が良好で，高濃度を維持する モキシフロキサシン（MFLX）の上に 網掛け文字で「フルオロキサシン系」を挿入
11	表の最下段	・0.3%点眼液　×3/日　㊂眼痛（しみる），味覚異常（苦味），眼充血，眼刺激	・**0.5**%点眼液　**×3 または 5**/日　㊂眼痛（しみる），味覚異常（苦味），眼充血，眼刺激 太字の通り修正

2013 年 5 月 27 日
株式会社南江堂