

正 誤 表

「慢性便秘症診療ガイドライン 2017（第1刷～第3刷）」

下記の箇所にて誤りがございました。謹んでお詫びし訂正いたします。

頁	該当箇所	誤	正																
78	表 3 大柴胡湯の大黄，枳実，芍薬の数値に誤りあり	<table border="1"> <tr> <td>上腹部のはり感 を呈する患者 良好</td> <td>便秘</td> <td>大黄煎湯</td> <td>0.5</td> <td>1.0</td> <td>1.5</td> <td>大腸刺激 性+消化 管運動促 進</td> <td>●効力が発現して、腹壁からみぞおちま りにかけて重く、便秘の傾向があるも のの次の経理状：胃炎、悪血性や肥満に 伴う重く、頭痛、神経痛、肥満に効果 あり</td> </tr> </table>	上腹部のはり感 を呈する患者 良好	便秘	大黄煎湯	0.5	1.0	1.5	大腸刺激 性+消化 管運動促 進	●効力が発現して、腹壁からみぞおちま りにかけて重く、便秘の傾向があるも のの次の経理状：胃炎、悪血性や肥満に 伴う重く、頭痛、神経痛、肥満に効果 あり	<table border="1"> <tr> <td>上腹部のはり感 を呈する患者 良好</td> <td>便秘</td> <td>大黄煎湯</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>大腸刺激 性+消化 管運動促 進</td> <td>●効力が発現して、腹壁からみぞおちま りにかけて重く、便秘の傾向があるも のの次の経理状：胃炎、悪血性や肥満に 伴う重く、頭痛、神経痛、肥満に効果 あり</td> </tr> </table>	上腹部のはり感 を呈する患者 良好	便秘	大黄煎湯	1	2	3	大腸刺激 性+消化 管運動促 進	●効力が発現して、腹壁からみぞおちま りにかけて重く、便秘の傾向があるも のの次の経理状：胃炎、悪血性や肥満に 伴う重く、頭痛、神経痛、肥満に効果 あり
上腹部のはり感 を呈する患者 良好	便秘	大黄煎湯	0.5	1.0	1.5	大腸刺激 性+消化 管運動促 進	●効力が発現して、腹壁からみぞおちま りにかけて重く、便秘の傾向があるも のの次の経理状：胃炎、悪血性や肥満に 伴う重く、頭痛、神経痛、肥満に効果 あり												
上腹部のはり感 を呈する患者 良好	便秘	大黄煎湯	1	2	3	大腸刺激 性+消化 管運動促 進	●効力が発現して、腹壁からみぞおちま りにかけて重く、便秘の傾向があるも のの次の経理状：胃炎、悪血性や肥満に 伴う重く、頭痛、神経痛、肥満に効果 あり												

2018年2月27日

株式会社南江堂