

正 誤 表

「最新育児小児病学（第 8 版 第 1 刷）」

下記の箇所に誤りがございました。謹んでお詫びし訂正いたします。

| 頁 | 該当箇所 | 誤 | 正 |
|-----|------------------------|---|--|
| 190 | 図 20-8 項目名 | a. 焦点 <u>起始</u> 意識保持発作, b. 焦点 <u>起始</u> 意識減損発作 | a. 焦点意識保持発作, b. 焦点意識減損発作 |
| 234 | 「3 けいれん」上から 5 行目 | 全身のけいれんの場合は、通常、意識障害を伴い、間代性けいれんと強直性けいれんに分けられる（図 20-8d, p. 190 参照）。身体の一部のみのけいれんは焦点起始意識保持発作と呼ばれる。焦点起始意識保持発作の中にも意識レベルの低下を伴う場合がある（焦点起始意識減損発作, 図 20-8b, p. 190 参照）。 | 全般起始発作は通常、意識障害を伴い、欠神発作や強直間代発作、脱力発作がある。（図 20-8c-e, p. 190 参照）。焦点起始発作には、意識減損を伴わない焦点意識保持発作（図 20-8a, p. 190 参照）と意識減損を伴う焦点意識減損発作がある（図 20-8b, p. 190 参照）。ミオクロニー発作（図 20-8f, p. 190 参照）のように焦点起始発作、全般起始発作の両者でも起こるけいれんもある。 |
| 250 | 「20 章 神経・筋疾患」上から 2 項目目 | 2. 焦点 <u>起始</u> 意識保持発作, 焦点 <u>起始</u> 意識減損発作, 欠神発作, ミオクロニー発作, 強直間代発作, 脱力発作などがある。 | 2. 焦点意識保持発作, 焦点意識減損発作, 欠神発作, ミオクロニー発作, 強直間代発作, 脱力発作などがある。 |

2026 年 3 月 30 日

株式会社南江堂