

正 誤 表

「今日の治療薬 2018（第 1 刷）」

下記の箇所にご迷惑をいたしました。謹んでお詫びし訂正いたします。

頁	該当箇所	誤	正
8-9, 12-13	表 1 主な抗菌薬の選択の指標	(好気性グラム陰性桿菌) モラクセラ・カタラーリス, 淋菌, 髄膜炎菌	(好気性グラム陰性球菌) モラクセラ・カタラーリス, 淋菌, 髄膜炎菌
439	左段上から 14 行目	重症例では血液透析や濾過透析が必要で肝移植の対象にもなるが、乳児期早期より治療を開始し血中 Phe 値をコントロールすれば正常に発達し、予後は良好である。	重症例では血液透析や濾過透析が必要で肝移植の対象にもなる。生命予後は、最高血中アンモニア値やその持続期間と関連し、治療による速やかな正常化が重要である。
763	●ネキシウムの用量欄〈小児〉	〈小児〉①③1 歳以上 (20kg 未満) ; 1 回 10mg, <u>1 歳以上 (20kg 以上) ; 1 回 10~20mg</u> (胃潰瘍, 吻合部潰瘍, 逆流性食道炎 8 週間まで, 十二指腸潰瘍 6 週間まで, ③4 週間まで)	〈小児〉①1 歳以上 (20kg 未満) ; <u>1 日 1 回 10mg</u> , 1 歳以上 (20kg 以上) ; <u>1 日 1 回 10~20mg</u> (胃潰瘍, 吻合部潰瘍, 逆流性食道炎 8 週間まで, 十二指腸潰瘍 6 週間まで) <u>③1 歳以上 ; 1 日 1 回 10mg, 4 週間まで</u>
833	●ノベルジンの備考欄〈注〉	〈注〉〈検査〉妊婦投与時, 及び投与開始初期には 1 ヶ月毎に尿中銅排泄量を確認	〈注〉〈検査〉①妊婦投与時, 及び投与開始初期には 1 ヶ月毎に尿中銅排泄量を確認

2018 年 1 月 30 日
株式会社南江堂