

正 誤 表

「リウマチ・膠原病診療ゴールデンハンドブック（第3刷）」

下記の箇所に誤りがございました。謹んでお詫びし訂正いたします。

頁	該当箇所	誤	正
319	付録② SLE Disease Activity Index-2K (SLEDAI-2000) 表中の [皮膚] 所見	新規の紅斑	炎症性の皮疹 (※別紙差替え表あり)

2018年12月4日

株式会社南江堂

● SLE Disease Activity Index-2K (SLEDAI-2000)

臓器	所見	点数
中枢神経	痙攣発作	8
	精神症状	8
	器質性脳症候群	8
	視力障害（眼底異常所見）	8
	脳神経異常（新規）	8
	ループス頭痛（麻薬性鎮痛薬にも不応性）	8
	脳血管障害（新規）	8
血管炎	潰瘍，壊死，爪囲梗塞など	8
筋関節炎	多発性関節炎（ ≥ 2 関節）	4
	筋炎	4
腎炎	赤血球円柱	4
	赤血球尿（ > 5 RBC/HPF）	4
	蛋白尿（ > 0.5 /日）	4
	白血球尿（ > 5 WBC/HPF）	4
皮膚	炎症性の皮疹	2
	脱毛	2
	粘膜潰瘍（口腔あるいは鼻腔）	2
漿膜炎	胸膜炎	2
	心膜炎	2
検査所見	低補体血症（C3, C4, CH50の正常下限以下の低下）	2
抗DNA抗体高値	Farr法で $> 25\%$ の結合能	2
血小板減少	PLT > 10 万/mm ³	1
白血球減少	WBC $> 3,000$ /mm ³	1
発熱	BT $\geq 38.0^{\circ}\text{C}$ （感染などその他項目は除外）	1

SLEDAIは24の項目からなり，最高点は105点である

[Gladman DD et al : J Rheumatol 29 : 288-291, 2002より]