

正 誤 表

「今日の治療薬 2015（第 2 刷）」

下記の箇所に誤りがございました。謹んでお詫びし訂正いたします。

頁	該当箇所	誤	正
49	(商品名) セフспан	小児 1 回 1.5~2mg/kg, 1 日 2 回	小児 1 回 1.5~3mg/kg, 1 日 2 回
163	表 2 主な分子標的薬	オフアツズマブ/ヒト化	オフアツムマブ/ヒト
163	表 2 主な分子標的薬 薬剤名	モガムルズマブ	モガムリズムマブ
163	表 2 主な分子標的薬 薬剤名/抗体	パニツズマブ/ヒト化	パニツムマブ/ヒト
163	表 2 主な分子標的薬 薬剤名	タミパロテン	タミバロテン
196	(商品名) ノバントロン 注意マーク	従前にアントラサイクリン系薬を使用していない場合は 総投与量 160mg/m ² 以下に, 使用している場合は 100mg/m ² 以上に (蓄積性心毒性の恐れ).	従前にアントラサイクリン系薬を使用していない場合は 総投与量 160mg/m ² 以下に, 使用している場合は 100mg/m ² 以下に (蓄積性心毒性の恐れ).
514	表 3 エリスロポエチンの適応 症 (2) ダルベポエチンアルファ/ 腎性貧血 (CAPD 施行中及び透析 導入前): 小児: 維持: 1~2 行目	2 週に 1 回で貧血改善が維持されていれば 10~180 g	2 週に 1 回で貧血改善が維持されていれば 10~180 μg

724	(商品名) タケプロン (用量) 小児 (添外)	小児 (添外) 1～11 歳 : 初期 ; 30kg 以下 1 日 1 回 15mg, 30kg 以上 1 日 1～2 回 30mg. 引き続きの増量 ; 治療開始後 2 週以上経過しても反応がなければ 1 回 30mg , 1 日 2 回に増量. 12 歳以上 : 成人と同様	小児 (添外) 1～11 歳 : 初期 ; 30kg 以下 1 日 1 回 15mg, 30kg 以上 1 日 1～2 回 30mg. 引き続きの増量 ; 治療開始後 2 週以上経過しても反応がなければ 1 日最大 30mg まで, 1 日 2 回分服に増量. 12 歳以上 : 成人と同様
-----	-----------------------------	--	--

2015 年 12 月 1 日

株式会社南江堂