

正 誤 表

「今日の治療薬2026（第1刷）」

下記の箇所に誤りがございました。謹んでお詫びし訂正いたします。

頁	該当箇所	誤	正						
305	「適応外pick up」の上から5行目	1日2回、1回2単位が投与される。	1日2回、1回2錠が投与される。						
508	表3 主な骨粗鬆症治療薬の作用機序と特徴 女性ホルモン製剤の「特徴」	・わが国では現在骨粗鬆症の保険適用がない。	・ 混合型エストロゲン はわが国では現在骨粗鬆症の保険適用がない。						
922	一般名：ボルノレキサント水和物 商品名：ボルズィ 組成・剤形：容量欄「規制区分」 備考欄「使用上の注意」	<p>運転禁止マーク </p> <p>注 記載なし</p> <p><現状></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: small;"> <tr> <td style="width: 30%; vertical-align: top;"> ボルノレキサント水和物 vornorexant hydrate ボルズィ (大正製薬) 回10mg (大正製薬-Meiji Seika) 2.5mg錠 47.80 5mg錠 71.30 10mg錠 106.40 2025年10月取載 </td> <td style="width: 30%; vertical-align: top;"> 錠：2.5mg, 5mg, 10mg 1日1回5mg, 就寝直前, 最大：1日1回 中等度のCYP3A阻害薬併用時又は中等度肝障害(Child-Pugh分類B)：1日1回2.5mg 中等度のCYP3A阻害薬, グレープフルーツジュース/↓CYP3A誘導薬 傾眠, 悪夢(_____ 3%以上, _____ 1~3%) RMP(潜在) ナルコレプシー症状, 睡眠時麻痺・随伴症, 自殺念慮・自殺行動, 乱用の可能性 </td> <td style="width: 40%; vertical-align: top;"> 特 オレキシシン1及び2受容体を阻害。半減期は極めて短く, 入眠困難に効果が期待される 適 不眠症 禁 グリドレキサント(前頁)参照 相 ↑ 中枢神経抑制薬, 飲酒/↓ 中枢神経抑制薬, 飲酒/↑ 中枢神経抑制薬, 飲酒/↓ CYP3A誘導薬 </td> </tr> </table>	ボルノレキサント水和物 vornorexant hydrate ボルズィ (大正製薬) 回10mg (大正製薬-Meiji Seika) 2.5mg錠 47.80 5mg錠 71.30 10mg錠 106.40 2025年10月取載	錠：2.5mg, 5mg, 10mg 1日1回5mg, 就寝直前, 最大：1日1回 中等度のCYP3A阻害薬併用時又は中等度肝障害(Child-Pugh分類B)：1日1回2.5mg 中等度のCYP3A阻害薬, グレープフルーツジュース/↓CYP3A誘導薬 傾眠, 悪夢(_____ 3%以上, _____ 1~3%) RMP(潜在) ナルコレプシー症状, 睡眠時麻痺・随伴症, 自殺念慮・自殺行動, 乱用の可能性	特 オレキシシン1及び2受容体を阻害。半減期は極めて短く, 入眠困難に効果が期待される 適 不眠症 禁 グリドレキサント(前頁)参照 相 ↑ 中枢神経抑制薬, 飲酒/↓ 中枢神経抑制薬, 飲酒/↑ 中枢神経抑制薬, 飲酒/↓ CYP3A誘導薬	<p>運転注意マーク </p> <p>注 眠気やめまいを感じたら運転等は避ける</p> <p><訂正後イメージ図></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: small;"> <tr> <td style="width: 30%; vertical-align: top;"> ボルノレキサント水和物 vornorexant hydrate ボルズィ (大正製薬) 回10mg (大正製薬-Meiji Seika) 2.5mg錠 47.80 5mg錠 71.30 10mg錠 106.40 2025年10月取載 </td> <td style="width: 30%; vertical-align: top;"> 錠：2.5mg, 5mg, 10mg 1日1回5mg, 就寝直前, 最大：1日1回 中等度のCYP3A阻害薬併用時又は中等度肝障害(Child-Pugh分類B)：1日1回2.5mg 中等度のCYP3A阻害薬, グレープフルーツジュース/↓CYP3A誘導薬 傾眠, 悪夢(_____ 3%以上, _____ 1~3%) RMP(潜在) ナルコレプシー症状, 睡眠時麻痺・随伴症, 自殺念慮・自殺行動, 乱用の可能性 </td> <td style="width: 40%; vertical-align: top;"> 特 オレキシシン1及び2受容体を阻害。半減期は極めて短く, 入眠困難に効果が期待される 適 不眠症 禁 グリドレキサント(前頁)参照 注 眠気やめまいを感じたら運転等は避ける 相 ↑ 中枢神経抑制薬, 飲酒/↑ 中枢神経抑制薬, 飲酒/↓ 中枢神経抑制薬, 飲酒/↓ CYP3A誘導薬 副 傾眠, 悪夢(_____ 3%以上, _____ 1~3%) RMP(潜在) ナルコレプシー症状, 睡眠時麻痺・随伴症, 自殺念慮・自殺行動, 乱用の可能性 </td> </tr> </table>	ボルノレキサント水和物 vornorexant hydrate ボルズィ (大正製薬) 回10mg (大正製薬-Meiji Seika) 2.5mg錠 47.80 5mg錠 71.30 10mg錠 106.40 2025年10月取載	錠：2.5mg, 5mg, 10mg 1日1回5mg, 就寝直前, 最大：1日1回 中等度のCYP3A阻害薬併用時又は中等度肝障害(Child-Pugh分類B)：1日1回2.5mg 中等度のCYP3A阻害薬, グレープフルーツジュース/↓CYP3A誘導薬 傾眠, 悪夢(_____ 3%以上, _____ 1~3%) RMP(潜在) ナルコレプシー症状, 睡眠時麻痺・随伴症, 自殺念慮・自殺行動, 乱用の可能性	特 オレキシシン1及び2受容体を阻害。半減期は極めて短く, 入眠困難に効果が期待される 適 不眠症 禁 グリドレキサント(前頁)参照 注 眠気やめまいを感じたら運転等は避ける 相 ↑ 中枢神経抑制薬, 飲酒/↑ 中枢神経抑制薬, 飲酒/↓ 中枢神経抑制薬, 飲酒/↓ CYP3A誘導薬 副 傾眠, 悪夢(_____ 3%以上, _____ 1~3%) RMP(潜在) ナルコレプシー症状, 睡眠時麻痺・随伴症, 自殺念慮・自殺行動, 乱用の可能性
ボルノレキサント水和物 vornorexant hydrate ボルズィ (大正製薬) 回10mg (大正製薬-Meiji Seika) 2.5mg錠 47.80 5mg錠 71.30 10mg錠 106.40 2025年10月取載	錠：2.5mg, 5mg, 10mg 1日1回5mg, 就寝直前, 最大：1日1回 中等度のCYP3A阻害薬併用時又は中等度肝障害(Child-Pugh分類B)：1日1回2.5mg 中等度のCYP3A阻害薬, グレープフルーツジュース/↓CYP3A誘導薬 傾眠, 悪夢(_____ 3%以上, _____ 1~3%) RMP(潜在) ナルコレプシー症状, 睡眠時麻痺・随伴症, 自殺念慮・自殺行動, 乱用の可能性	特 オレキシシン1及び2受容体を阻害。半減期は極めて短く, 入眠困難に効果が期待される 適 不眠症 禁 グリドレキサント(前頁)参照 相 ↑ 中枢神経抑制薬, 飲酒/↓ 中枢神経抑制薬, 飲酒/↑ 中枢神経抑制薬, 飲酒/↓ CYP3A誘導薬							
ボルノレキサント水和物 vornorexant hydrate ボルズィ (大正製薬) 回10mg (大正製薬-Meiji Seika) 2.5mg錠 47.80 5mg錠 71.30 10mg錠 106.40 2025年10月取載	錠：2.5mg, 5mg, 10mg 1日1回5mg, 就寝直前, 最大：1日1回 中等度のCYP3A阻害薬併用時又は中等度肝障害(Child-Pugh分類B)：1日1回2.5mg 中等度のCYP3A阻害薬, グレープフルーツジュース/↓CYP3A誘導薬 傾眠, 悪夢(_____ 3%以上, _____ 1~3%) RMP(潜在) ナルコレプシー症状, 睡眠時麻痺・随伴症, 自殺念慮・自殺行動, 乱用の可能性	特 オレキシシン1及び2受容体を阻害。半減期は極めて短く, 入眠困難に効果が期待される 適 不眠症 禁 グリドレキサント(前頁)参照 注 眠気やめまいを感じたら運転等は避ける 相 ↑ 中枢神経抑制薬, 飲酒/↑ 中枢神経抑制薬, 飲酒/↓ 中枢神経抑制薬, 飲酒/↓ CYP3A誘導薬 副 傾眠, 悪夢(_____ 3%以上, _____ 1~3%) RMP(潜在) ナルコレプシー症状, 睡眠時麻痺・随伴症, 自殺念慮・自殺行動, 乱用の可能性							

2026年4月28日
株式会社南江堂