

## 正 誤 表

「今日の治療薬2026（第1刷）」

下記の箇所に誤りがございました。謹んでお詫びし訂正いたします。

頁	該当箇所	誤	正						
508	表3 主な骨粗鬆症治療薬の作用機序と特徴 女性ホルモン製剤の「特徴」	・わが国では現在骨粗鬆症の保険適用がない。	・ <b>結合型エストロゲン</b> はわが国では現在骨粗鬆症の保険適用がない。						
922	一般名：ボルノレキサント水和物 商品名：ボルズイ 組成・剤形・容量欄「規制区分」 備考欄「使用上の注意」	<p>運転禁止マーク </p> <p><b>注</b> 記載なし</p> <p>&lt;現状&gt;</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: small;"> <tr> <td style="width: 30%;">                     ボルノレキサント水和物 vornorexant hydrate <b>新</b>ボルズイ (大正製薬)                      2.5mg錠 47.80 5mg錠 71.30 10mg錠 106.40 2025年10月取載                 </td> <td style="width: 30%;">                     錠：2.5mg, 5mg, 10mg                      1日1回5mg, 就寝直前, 最大：1日1回10mg                      中等度のCYP3A阻害薬併用時又は中等度肝障害(Child-Pugh分類B)：1日1回2.5mg                      中程度のCYP3A阻害薬, グレープフルーツジュース/↓CYP3A誘導薬                      傾眠, 悪夢( ____ 3%以上, ____ 1~3%)                      RMP (潜在) ナルコレプシー症状, 睡眠時麻痺・随伴症, 自殺念慮・自殺行動, 乱用の可能性                 </td> <td style="width: 40%;">                     (特) オレキシシン1及び2受容体を阻害, 半減期は極めて短く, 入眠困難に効果が期待される                      (適) 不眠症                      (禁) グリドレキサント(前頁)参照                      (相) ①↑中枢神経抑制薬, 飲酒/②↑中枢神経抑制薬, 飲酒/③中等度のCYP3A阻害薬, グレープフルーツジュース/④中等度のCYP3A阻害薬, グレープフルーツジュース/⑤CYP3A誘導薬                      傾眠, 悪夢( ____ 3%以上, ____ 1~3%)                      RMP (潜在) ナルコレプシー症状, 睡眠時麻痺・随伴症, 自殺念慮・自殺行動, 乱用の可能性                 </td> </tr> </table>	ボルノレキサント水和物 vornorexant hydrate <b>新</b> ボルズイ (大正製薬) 2.5mg錠 47.80 5mg錠 71.30 10mg錠 106.40 2025年10月取載	錠：2.5mg, 5mg, 10mg 1日1回5mg, 就寝直前, 最大：1日1回10mg 中等度のCYP3A阻害薬併用時又は中等度肝障害(Child-Pugh分類B)：1日1回2.5mg 中程度のCYP3A阻害薬, グレープフルーツジュース/↓CYP3A誘導薬 傾眠, 悪夢( ____ 3%以上, ____ 1~3%) RMP (潜在) ナルコレプシー症状, 睡眠時麻痺・随伴症, 自殺念慮・自殺行動, 乱用の可能性	(特) オレキシシン1及び2受容体を阻害, 半減期は極めて短く, 入眠困難に効果が期待される (適) 不眠症 (禁) グリドレキサント(前頁)参照 (相) ①↑中枢神経抑制薬, 飲酒/②↑中枢神経抑制薬, 飲酒/③中等度のCYP3A阻害薬, グレープフルーツジュース/④中等度のCYP3A阻害薬, グレープフルーツジュース/⑤CYP3A誘導薬 傾眠, 悪夢( ____ 3%以上, ____ 1~3%) RMP (潜在) ナルコレプシー症状, 睡眠時麻痺・随伴症, 自殺念慮・自殺行動, 乱用の可能性	<p>運転注意マーク </p> <p><b>注</b> 眠気やめまいを感じたら運転等は避ける</p> <p>&lt;訂正後イメージ図&gt;</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: small;"> <tr> <td style="width: 30%;">                     ボルノレキサント水和物 vornorexant hydrate <b>新</b>ボルズイ (大正製薬)                      2.5mg錠 47.80 5mg錠 71.30 10mg錠 106.40 2025年10月取載                 </td> <td style="width: 30%;">                     錠：2.5mg, 5mg, 10mg                      1日1回5mg, 就寝直前, 最大：1日1回10mg                      中等度のCYP3A阻害薬併用時又は中等度肝障害(Child-Pugh分類B)：1日1回2.5mg                      中程度のCYP3A阻害薬, グレープフルーツジュース/↓CYP3A誘導薬                      傾眠, 悪夢( ____ 3%以上, ____ 1~3%)                      RMP (潜在) ナルコレプシー症状, 睡眠時麻痺・随伴症, 自殺念慮・自殺行動, 乱用の可能性                 </td> <td style="width: 40%;">                     (特) オレキシシン1及び2受容体を阻害, 半減期は極めて短く, 入眠困難に効果が期待される                      (適) 不眠症                      (禁) グリドレキサント(前頁)参照                      (注) 眠気やめまいを感じたら運転等は避ける                      (相) ①↑中枢神経抑制薬, 飲酒/②↑中等度のCYP3A阻害薬, グレープフルーツジュース/③中等度のCYP3A阻害薬, グレープフルーツジュース/④CYP3A誘導薬                      傾眠, 悪夢( ____ 3%以上, ____ 1~3%)                      RMP (潜在) ナルコレプシー症状, 睡眠時麻痺・随伴症, 自殺念慮・自殺行動, 乱用の可能性                 </td> </tr> </table>	ボルノレキサント水和物 vornorexant hydrate <b>新</b> ボルズイ (大正製薬) 2.5mg錠 47.80 5mg錠 71.30 10mg錠 106.40 2025年10月取載	錠：2.5mg, 5mg, 10mg 1日1回5mg, 就寝直前, 最大：1日1回10mg 中等度のCYP3A阻害薬併用時又は中等度肝障害(Child-Pugh分類B)：1日1回2.5mg 中程度のCYP3A阻害薬, グレープフルーツジュース/↓CYP3A誘導薬 傾眠, 悪夢( ____ 3%以上, ____ 1~3%) RMP (潜在) ナルコレプシー症状, 睡眠時麻痺・随伴症, 自殺念慮・自殺行動, 乱用の可能性	(特) オレキシシン1及び2受容体を阻害, 半減期は極めて短く, 入眠困難に効果が期待される (適) 不眠症 (禁) グリドレキサント(前頁)参照 (注) 眠気やめまいを感じたら運転等は避ける (相) ①↑中枢神経抑制薬, 飲酒/②↑中等度のCYP3A阻害薬, グレープフルーツジュース/③中等度のCYP3A阻害薬, グレープフルーツジュース/④CYP3A誘導薬 傾眠, 悪夢( ____ 3%以上, ____ 1~3%) RMP (潜在) ナルコレプシー症状, 睡眠時麻痺・随伴症, 自殺念慮・自殺行動, 乱用の可能性
ボルノレキサント水和物 vornorexant hydrate <b>新</b> ボルズイ (大正製薬) 2.5mg錠 47.80 5mg錠 71.30 10mg錠 106.40 2025年10月取載	錠：2.5mg, 5mg, 10mg 1日1回5mg, 就寝直前, 最大：1日1回10mg 中等度のCYP3A阻害薬併用時又は中等度肝障害(Child-Pugh分類B)：1日1回2.5mg 中程度のCYP3A阻害薬, グレープフルーツジュース/↓CYP3A誘導薬 傾眠, 悪夢( ____ 3%以上, ____ 1~3%) RMP (潜在) ナルコレプシー症状, 睡眠時麻痺・随伴症, 自殺念慮・自殺行動, 乱用の可能性	(特) オレキシシン1及び2受容体を阻害, 半減期は極めて短く, 入眠困難に効果が期待される (適) 不眠症 (禁) グリドレキサント(前頁)参照 (相) ①↑中枢神経抑制薬, 飲酒/②↑中枢神経抑制薬, 飲酒/③中等度のCYP3A阻害薬, グレープフルーツジュース/④中等度のCYP3A阻害薬, グレープフルーツジュース/⑤CYP3A誘導薬 傾眠, 悪夢( ____ 3%以上, ____ 1~3%) RMP (潜在) ナルコレプシー症状, 睡眠時麻痺・随伴症, 自殺念慮・自殺行動, 乱用の可能性							
ボルノレキサント水和物 vornorexant hydrate <b>新</b> ボルズイ (大正製薬) 2.5mg錠 47.80 5mg錠 71.30 10mg錠 106.40 2025年10月取載	錠：2.5mg, 5mg, 10mg 1日1回5mg, 就寝直前, 最大：1日1回10mg 中等度のCYP3A阻害薬併用時又は中等度肝障害(Child-Pugh分類B)：1日1回2.5mg 中程度のCYP3A阻害薬, グレープフルーツジュース/↓CYP3A誘導薬 傾眠, 悪夢( ____ 3%以上, ____ 1~3%) RMP (潜在) ナルコレプシー症状, 睡眠時麻痺・随伴症, 自殺念慮・自殺行動, 乱用の可能性	(特) オレキシシン1及び2受容体を阻害, 半減期は極めて短く, 入眠困難に効果が期待される (適) 不眠症 (禁) グリドレキサント(前頁)参照 (注) 眠気やめまいを感じたら運転等は避ける (相) ①↑中枢神経抑制薬, 飲酒/②↑中等度のCYP3A阻害薬, グレープフルーツジュース/③中等度のCYP3A阻害薬, グレープフルーツジュース/④CYP3A誘導薬 傾眠, 悪夢( ____ 3%以上, ____ 1~3%) RMP (潜在) ナルコレプシー症状, 睡眠時麻痺・随伴症, 自殺念慮・自殺行動, 乱用の可能性							

2026年2月10日  
株式会社南江堂