









正 誤 表

「コンパス生化学（改訂第2版 第1・2刷）」

下記の箇所にて誤りがございました。謹んでお詫びし訂正いたします。

頁	該当箇所	誤	正
9	脇組 上から2行目	どちらも fiber の略で～	どちらも fiberの <u>訳</u> で～
43	上から 9・12 行 目	(図3・9C)	(図3・9B)
46	図3・11 脚注 上から2行目	セルロースも <u>アミロペクチン</u> も～	セルロースも <u>アミロース</u> も～
107	ポイント 上から2行目	リボサイム	リボザイム
200	図9・17	下図に差し替え ミネラル(鉱質)コルチコイド  アルドステロン グルコ(糖質)コルチコイド  コルチゾール  コルチコステロン 男性ホルモン  テストステロン 卵胞ホルモン  エストラジオール  エストリオール 黄体ホルモン  プロゲステロン 図9・17 ステロイドホルモン	
223	図10・12	下図に差し替え  図10・12 二次性能動輸送体の分類 共役輸送体のうち、共輸送体では▲、対向輸送体では■が能動輸送されている。	

頁	該当箇所	誤	正
257	図 12・3	下図に差し替え (①③⑦⑩) の +P_i を削除, ⑥ に +P_i と +H⁺ を追加, ⑨ に H₂O を追加) 図 12・3 解糖系の反応 ⑥ からあと、後半の反応はグルコース 1 分子あたり、2 分子である。不可逆反応を太矢印で示す。	

頁	該当箇所	誤	正
321	図 13・15	下図に差し替え（コルチコステロン，コルチゾールの構造を訂正） 図 13・15 副腎皮質ホルモンの生成	
356	図 14・17	下図に差し替え 図 14・17 セロトニンの生成	
356	脇組 *6 メラトニン	右図に差し替え	
446	4 章 4 構造式	下図に差し替え	

2024 年 6 月 18 日
株式会社南江堂